


Hygiene- Management bei Noroviren



Leitsymptome:

Akutes Erbrechen und/ oder heftige Durchfälle, Übelkeit, evtl. Fieber, Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen.

Inkubationszeit:

10- 50 Stunden

Infektiösität (Virusausscheidungen im Stuhl):

In der Regel 7-14 Tage

Meldepflicht nach IFSG (bei Verdacht u. Erkrankung):

Bei gehäufterem Auftreten >2 Betroffene!

Bei Mitarbeitern im Lebensmittelbereich auch der Einzelfall!
Beim Virusnachweis (Labormeldung).

Besonders beachten!

Die Händehygiene mit einem Virus inaktivierenden Mittel ist die wichtigste hygienische Maßnahme!

Das Patientenzimmer und alle Kontaktflächen werden **täglich** mit einem viruziden Flächendesinfektionsmittel **desinfiziert!**

Minimieren der Patienten-, Bewohner- und Personalbewegung

(keine Nutzung von Gemeinschaftsräumen, kein Austausch von Personal mit anderen Stationen/ Abteilungen/ Bereichen, keine Routineuntersuchungen)
Bettruhe und **eingeschränkter Kontakt** für akut Erkrankte!

Schutzkleidung:

Schutzkittel bei Tätigkeiten am Patienten/ Bewohner.
Handschuhe bei direktem Kontakt.
Standard Mund- Nasenschutz bei Erbrechen der Erkrankten.

Wäsche:

Bett und Leibwäsche geschlossen (Kennzeichnung „infektiös“) transportieren und chemo- thermisch bei 60°C waschen.

Abfälle:

Im Zimmer sammeln und auf direktem Weg entsorgen (normaler Abfall).

Geschirr:

Keine besonderen Maßnahmen.

Die erhöhten Desinfektionsmaßnahmen werden über 14 Tage nach dem letzten betroffenen Patienten **weitergeführt.**